

- 藥物 :Midazolam (Dormicum) 5mg/ml
- 劑量:0.2mg/Kg，最大劑量不超過5mg
- 給藥方法:加糖漿口服或教導置於舌下，最好能呈漱口狀，先含著再吞，使快速吸收
- 使用範圍：年齡:Age≥8個月~學齡期兒童
- 開始作用:服用10min 後
- 作用時間:30min

## 一、餵藥時間:

- 1)該房巡迴麻護配合第一台下刀時間,8:00前立刻至護理站查看已報到的小孩，確定禁食時間，詢問病史，無任何特殊疾病即可餵藥
- 2)若有特殊病史或問題如:感冒咳嗽發燒或其他狀況，請麻醉醫師評估是否可餵藥
- 3)配合接台時間餵藥，以免給藥時間過久而還無法接台的情況發生
- 4)若小孩完全無法配合餵藥，請醫師評估後決定給藥方式
- 5)若小孩完全不肯報到更衣，可先餵藥，等藥物作用後再行更衣
- 6)可一杯純糖水給家屬陪同孩子一起飲

## 二、注意事項

- 1)若餵藥後效果不佳，請示醫師同意後，依醫囑追加藥物
- 2)餵藥後一定教導家屬注意孩子的安全，預防跌倒，並給預防跌倒貼紙貼於手圈上(依據衛生署病人安全目標:預防病人跌倒)
- 3)餵藥後一定在**手術預定表及預防跌倒貼紙**上註明餵藥時間及劑量定通知主護前來照顧病人
- 4)給藥後等候期間，請提供我的醫院之旅 圖書本及畫筆或玩具以減輕焦慮
- 5)有需要可以接 pulse oximetry 確認氧氣狀態

6)於欲建立點滴處塗上 EMLA 並做上範圍記號,十分鐘後小孩進入解離安靜狀態，再帶

進開刀房吸麻藥打點滴

7)若有帶點滴進入手術室，則依醫囑給口服藥或靜脈給藥

8)若病人要帶入手術室，將從靜脈給藥時，請流動護士準備推車，須在推車上給藥，再與流動護士共同帶入手術室

pre-warm

床上先鋪上小孩用溫毯事先溫暖，讓小孩一進來就能躺在暖暖的床上

9)建立呼吸道及點滴之後，側躺做 caudal block

建議劑量如下

bupivacaine 0.125–0.25% and ropivacaine 0.1–0.375%

volume : 0.5–1.25 ml/ kg