



備勞喘 定量噴霧液

Berotec® N Metered Aerosol



備勞喘定量噴霧液用於支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴有支氣管痙攣之肺支氣管障礙之支氣管痙攣疾患之預防和治療。




如何使用此藥物:

此裝置在第一次使用前，請向地面下壓鐵罐 2 次。


每次使用時步驟:(如下)

1. 移去護蓋。



2. 將噴霧劑上下搖動，以預防藥物沉澱。

3. 接上塑膠輔助器。



4. 慢慢呼一口氣 (請勿對吸嘴吹氣)。

5. 兩唇含住塑膠輔助管的另一端，開始緩慢深吸氣並同時將鐵罐向下壓，繼續緩慢深吸氣的動作不可中斷。

6. 將吸入劑從嘴唇移開，閉氣 10 秒。

7. 蓋回瓶蓋。

8. 注意事項:

- 一瓶藥物可使用 200 次，因藥物無計數指示窗，建議您可於使用時記錄使用次數(一般在急性發作時使用)，每天不得超過 8 個劑量。請依醫師指示劑量使用，勿自行調整劑量。

- 急性氣喘發作:

對大多數患者，使用一個劑量即可緩解症狀。若吸入 5 分鐘後，呼吸沒有明顯改善，可投與第二個劑量。投與第二個劑量後，若治療仍未改善，您應立即請教醫師或就醫。

- 清潔:吸入輔助器請以清水沖洗並自然風乾。

藥品保存方式:

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。