



慈濟藥訊

TZU CHI HOSPITAL PHARMACY BULLETIN

出版單位： 花蓮慈濟醫院藥劑部
 總編輯： 劉采艷
 執行編輯： 陳仲揚
 編輯： 陳怡珊、張維舜、黃欣怡、黃詠銘、彭鳳宜

新藥介紹

造血幹細胞驅動劑

- Plerixafor

彭鳳宜 藥師

非何杰金氏淋巴瘤 (non-Hodgkin's lymphoma, NHL) 或多發性骨髓瘤 (multiple myeloma, MM) 是常見的血液惡性疾病，治療方式除了化療、放療或標靶治療外，自體造血幹細胞移植也是治療選擇之一。現今造血幹細胞多由周邊血收集，但周邊血一般僅含微量造血幹細胞，需先給予造血生長因子，如 G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor)，驅動 (mobilization) 骨髓內造血幹細胞至周邊血，以獲足夠數量供移植之需。為達更佳驅動效果，G-CSF 可搭配新機轉之造血幹細胞驅動劑。

本院新進藥品造血幹細胞驅動劑 plerixafor (Mozobil[®]，總動原注射劑)，是一澄清無色至淡黃色注射液，可抑制造血幹細胞或腫瘤細胞之 CXC chemokine receptor 4 (CXCR4)，阻斷 CXCR4 與骨髓內骨質細胞之 stromal cell-derived factor-1-alpha (SDF-1 α) 連結，使白血球細胞增生及周邊血造血先驅細胞增加。所以 plerixafor 搭配 G-CSF 可協同驅動出足夠帶有 CD34+ 抗原的造血幹細胞，以供移植之用。由於被驅動的造血幹細胞表面有 CD34+ 抗原，可用此標誌定量及計數造血幹細胞，也可降低微量癌細胞污染可能性。

Plerixafor 療效的主要第 3 期臨床試驗，為 2 項針對未經歷幹細胞收集失敗的 298 位 NHL 及 302 位 MM 患者，同時搭配 G-CSF 的 RCT 試驗，與安慰劑比較驅動幹細胞效果。療效指標為在限定天數內 (NHL : ≤ 4 天、MM : ≤ 2 天與 ≤ 4 天)，得到最佳 CD34+ 細胞 (5 或 6×10^6 /kg) 結果顯示 59.3% vs. 19.6% , $p < 0.001$ in NHL ; 71.6% vs. 34.4% , $p < 0.001$ in MM (≤ 2 天) ; 75.7% vs. 51.3% , $p < 0.001$ in MM (≤ 4 天) 及同時植入成功者，結果分別為 57.3% vs. 18.9% , $p < 0.001$ in NHL ; 70.3% vs. 34.4% , $p < 0.001$ in MM (≤ 2 天) ; 另外在限定天數 (≤ 4 天) 內，得

到最少的 CD34+ 細胞 (2×10^6 /kg)，結果分別為 86.7% vs. 47.3% , $p < 0.001$ in NHL ; 95.3% vs 88.3% , $p = 0.031$ in MM ; 及同時植入成功者，結果為 84.0% vs. 43.2% , $p < 0.001$ in NHL。這兩項試驗結果，plerixafor 較安慰劑有顯著較多達主要療效指標。

Plerixafor 的衛生福利部核准適應症是與 G-CSF 併用，驅動造血幹細胞至周邊血液供收集以施行自體移植；適用於須施行自體移植之 NHL 或 MM，但驅動不佳者。使用此藥前，應先給予 G-CSF (10 mcg/kg once daily) 4 天，在分離術 (apheresis) 開始前 6-11 小時，皮下注射 plerixafor 連續 2-4 天 (最多 7 天)。劑量依實際體重計算 (0.24 mg/kg/day)，最大日劑量 40 mg；在腎功能不佳者， Cl_{Cr} 20-50 mL/min，應減量 1/3 為 0.16 mg/kg/day，最大日劑量 27 mg；但 $Cl_{Cr} < 20$ mL/min 及血液透析尚無明確資料。雖無足夠資料證實，但懷孕時使用仍可能引起胎兒畸形，因此懷孕期間不應使用，治療期應採有效避孕措施。目前未知 plerixafor 是否分泌至母乳，無法排除哺乳風險，治療期應停止哺乳。

Plerixafor 不良反應是在合併 G-CSF 治療所發生，常見有腹瀉 (37%)、噁心 (34%)、注射及輸注部位反應 (34%，如水腫、血腫、紅斑)、疲勞 (27%)、頭痛 (22%) 及頭暈 (11%) 等。這些不良反應發生率在各腫瘤的類別、年齡或性別無顯著差別；另外，僅少於 1% 在給藥 30 分鐘內發生輕至中度過敏，如蕁麻疹、眼腫、呼吸困難或缺氧等。Plerixafor 與 G-CSF 併用，除了驅動造血幹細胞至周邊血，也驅動腫瘤細胞出來被收集，然而在對 NHL 或 MM 試驗中，尚未觀察到此現象；但 plerixafor 可能驅動白血病 (leukemia) 細胞，所以不可用於白血病患者造血幹細胞的驅動與獲得。而 plerixafor 會增加白血球與減少血小板數量，用藥時應監測其變化。

目前周邊血自體造血幹細胞移植是 NHL 或 MM 重要治療選擇，但可能因數量不足而被迫放棄。Plerixafor 搭配 G-CSF 已證實可增加驅動造血幹細胞效果，使周邊血造血幹細胞數量增加，提供移植者一個新治療選擇。

1. Mozobil®中文仿單 <http://www-micromedexsolutions-com.hls.w.tzuchi.com.tw:81/> (cited: Jul/14/2015)
2. Micromedex® 2.0, (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at:

期刊閱讀分享

篇名	New and Emerging Treatments for Cystic Fibrosis
<p>內容摘要</p>	<p>囊狀纖維化，在西方人比較常見，由於第七對體染色體上有關合成 Cystic Fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)基因突變，使得 CFTR protein 無法合成或功能異常，影響到 CFTR protein 調控的 Cl channel 失去功能，增加痰液與汗液中的氯離子，導致肺支氣管內痰液增加，無法正常排出，長期下來容易造成細菌感染。以前這種疾病只能用症狀治療，並無特殊藥品。</p> <p>近年來有許多臨床研究針對基因突變的部分研發新的藥物。首先，基因治療已經完成了 phase IIb study，研究報告尚未公布，而幹細胞治療也正在進行臨床試驗。另外，針對 CFTR 基因突變而導致 mRNA 無法形成的 class I mutation 病患，有藥物 ataluren 正在進行 phase III study。</p> <p>目前已經完成臨床試驗並且上市的藥品 ivacaftor 是 CFTR potentiators，可以增強 CFTR protein 調控的 Cl channel，降低痰液與汗液的氯離子濃度，改善囊狀纖維化病人的 FEV1 且具有統計上的意義。另一個近期上市的 lumacaftor 則是對 F508del 突變有效果，可以和 ivacaftor 一起併用治療囊狀纖維化。</p> <p>由於囊狀纖維化容易有綠膿桿菌的感染，所以吸入型的抗生素也就針對此部分加以研究，有乾粉型與吸入液等劑型，另外還有 sildenafil 與吸入型 glutathione 的臨床試驗。對於上述的新型臨床試驗結果出爐後，可讓囊狀纖維化的治療提供更多樣的方式。</p>
<p>臨床結語</p>	<p>雖然囊狀纖維化在台灣屬於罕見疾病，並無藥物可以治療，對於嚴重病人最後只能採用肺臟移植。現在已經有相關藥品研發上市，可讓此類病人得以控制疾病。對於吸入型的抗生素，雖然特殊劑型仍在研發，但對於相同成分的抗生素，國內罕病患者可以選擇搭配呼吸機吸入治療感染情況。</p>
<p>資料來源</p>	<p>Drugs.January 2015, Volume 75, Issue 1, pp 1165-75</p>
<p>撰稿作者</p>	<p>花蓮慈濟醫院藥劑部 臨床藥學科 <u>張維舜</u>藥師</p>

含 clozapine 成分藥品可能引發嚴重腸蠕動功能障礙併發症

全國藥物不良反應通報中心近年接獲多件疑似因使用含 clozapine 成分藥品引起腸蠕動功能障礙之案例，其中兩例分別因嚴重腸阻塞 (ileus) 與缺血性腸症 (ischemic bowel disease) 而致死。

含 clozapine 成分藥品因具有抗膽鹼作用，可能引發便秘等問題為大部分醫療人員所熟知，然部分個案卻可能發生嚴重腸道併發症，故提醒醫師處方含 clozapine 成分藥品時，應注意劑量調整幅度不宜過快，並留意腸胃道相關症狀，以即早因應可能出現腸阻塞或缺血性腸症等嚴重不良反應之發生。

本院品項：

Zapine 100 mg/tab (Clozapine)

Clopine 25 mg/tab (Clozapine)

Clopidogrel 成分藥品可能引起 SJS、TEN、DRESS

全國藥物不良反應通報中心近年接獲數件疑似因使用含 clopidogrel 成分藥品引起 Stevens-Johnson syndrome (SJS)、toxic epidermal necrolysis (TEN)、drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) 之案例，且部分嚴重個案後果為死亡。

雖部分通報個案可能因同時使用其他藥品，或本身身體狀況不佳而導致死亡，但有鑑於含 clopidogrel 成分藥品在國內廣泛使用，故提醒含 clopidogrel 成分藥品可能發生罕見但嚴重之皮膚不良反應 (SJS/TEN/DRESS)，醫療人員應主動告知患者，若發生皮膚黏膜不適時，應立即停藥並回診處方醫師；經停藥症狀改善後，亦不可再重複投予含 clopidogrel 成分藥品，以避免發展至 SJS/TEN/DRESS 等嚴重皮膚不良反應。

本院品項：

Plavix 75 mg/tab (Clopidogrel)

Plavix 300 mg/tab (Clopidogrel)

Clopidogrel Sandoz 75 mg/tab (Clopidogrel)

※ 資料來源：全國藥物不良反應通報

※ 提醒醫療人員，若有任何藥物不良反應，請由醫囑、護囑系統通報，或撥打 13297、13097 電話通報。



5.6.1 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive) (101/3/1、101/5/1、102/2/1、102/8/1、103/2/1、103/10/1、104/8/1)

自一百零四年八月一日生效

1.藥品種類

- (1)Bisphosphonates (雙磷酸鹽類):alendronate (如 Fosamax)、zoledronate 5 mg (如 Aclasta 5mg/100mL solution for infusion)、risedronate (如 Reosteo)、ibandronate 3 mg/3 mL (如 Bonviva 3 mg/3 mL solution for injection)
- (2)Selective estrogen receptor modulators (SERM·選擇性雌激素接受體調節劑):raloxifene (如 Evista)、bazedoxifene (如 Viviant) (102/2/1)
- (3)Human monoclonal antibody for RANKL (RANKL 單株抗體): denosumab (如 Prolia) (101/3/1)

2.使用規定

- (1)限用於停經後婦女 (alendronate、zoledronate、denosumab 及 risedronate 亦可使用於男性) 因骨質疏鬆症 (須經 DXA 檢測 BMD 之 T score \leq -2.5SD) 引起脊椎或髖部骨折，或因骨質疏少症 (osteopenia) (經 DXA 檢測 BMD 之 -2.5SD <T score <-1.0SD) 引起脊椎或髖部 2 處或 2 次 (含) 以上之骨折。(101/5/1、102/8/1、103/10/1、104/8/1)
- (2)治療時，一次限用一項藥物，不得併用其他骨質疏鬆症治療藥物。
- (3)使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。

本院品項：

Fosamax Plus tab (Alendronate 70 mg & Cholecalciferol 140 ug)
Aclasta 5 mg/100 ml/vial (Zoledronic Acid)
Bonviva 3 mg/3 ml/syringe (Ibandronate Sodium)
Evista 60 mg/tab (Raloxifene)
Prolia 60 mg/ml/vial (Denosumab)

2.8.2.3. ~~Bosentan (如 Tracleer)~~; Ambrisentan (如 Volibris); macitentan (如 Opsumit) (98/12/1、103/7/1、104/8/1):

自一百零四年八月一日生效

1. 限用於原發性肺動脈高血壓之治療。
2. 需經事前審查核准後使用。
3. 每次限用 1 粒。

本院品項：

Volibris 10 mg/tab (Ambrisentan)
Opsumit 10 mg/tab (Macitentan)
Tracleer 62.5 mg/tab (Bosentan)
TRACLEER 125 mg/tab (Bosentan)

2.8.2.5. Bosentan (如 Tracleer) (98/12/1 、 103/7/1 、 104/8/1) :



自一百零四年八月一日生效

1. 用於原發性肺動脈高血壓。
2. 用於因先天性心臟病續發 WHO Functional Class III 肺動脈高血壓(伴隨先天性 Systemic-to-pulmonary shunts 與 Eisenmenger physiology)。
3. 需經事前審查核准後使用。
4. 每次限用 1 粒。

本院品項：

Tracleer 62.5 mg/tab (Bosentan)

Tracleer 125 mg/tab (Bosentan)



104 年 7 月新進藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Mirabegron 25 mg/tab	Betmiga 貝坦利持續性藥效錠 (安斯泰來) 衛署藥輸字第 026217 號	褐色 橢圓形 口服/錠劑 325	治療伴有急尿、頻尿和/或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。	不可磨粉或剝半。 (1040701公告)	37元
					
Ulipristal acetate 5 mg/tab; 28 tabs/box	Esmya 恩惜膜 (友華) 衛部藥輸字第 026312 號	白色 圓形 口服/錠劑 ES5	使用於患有中等至嚴重程度子宮纖維瘤症狀的生育年齡成年女性，作為手術前治療之用。	治療前，應先排除懷孕的可能。 (1040702公告)	自費價 4200 元/盒
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Zonisamide 100 mg/tab	Zonegran 佐能安膜衣錠 (衛采) 衛署藥製字第 057199 號	白色 圓形 口服/錠劑 P132	成人局部癲癇發作之輔助治療。適用於下列癲癇發作類型： 1. 單純性局部癲癇發作 2. 複雜性局部癲癇發作 3. 局部癲癇發作續發型之全身性強直-陣攣性發作	若有喉痛嘴破、眼睛癢、皮膚紅疹，應立即停藥回診。 (1040714公告)	18.8 元
					
Ipilimumab 50 mg/10 mL/vial	Yervoy 益伏注射劑 (BAXTER) 衛部菌疫輸字第 000958 號	針劑/注射	適用於治療成人曾接受其他療法之無法切除或轉移性黑色素瘤。	※臨採自費新藥·限病患處方。 (1040714公告)	自費價 209000元
					

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
ZnO & Diphenhydramine & Dibucaine HCl 120 mg/gm 120 mL/bt	Sinbaby 金貝比嬰兒擦劑 (杏輝) 衛署藥製字第 020215 號	外用/液劑	緩解皮膚刺激及尿布疹，暫時緩解皮膚搔癢， 昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢。	※ Sinbaby® 恢復供 貨。 (1040720公告)	33.7元
					



104 年 7 月換廠藥品

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ampicillin & Sulbactam 1.5 g/vial	Sulampi 舒安比 (政德) 衛署藥製字第 052553 號	針劑/注射	Subacillin 優合西林. (永信) 衛署藥製字第 046544 號	針劑/注射	鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、沙雷氏菌、流行感冒嗜血桿菌、口引口朵陰性變形桿菌屬、檸檬酸菌屬、厭氧性細菌引起之感染症。	※廠商缺貨 (1040624 公告)	96 元
							
Bromhexine 8 mg/tab	Wincou 溫克咳 (瑞士) 衛署藥製字第 008061 號	黃色 圓形 口服/錠劑 圖騰/刻痕	Shitan 釋痰 (國嘉) 衛署藥製字第 034950 號	粉紅色 圓形 口服/錠劑 K/刻痕	祛痰及減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性。	服藥初期支氣管粘液被溶解，痰及咳嗽會增加。 (1040624 公告) ※藥品恢復供貨	0.4 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Bethanechol 25 mg/tab	Bethanechol 脲酯膽鹼 (強生) 衛署藥製字第 044254 號	黃色 三角形 口服/錠劑 刻痕	Dampurine 舒解 (健亞) 衛署藥製字第 044365 號	黃色 圓形 口服/錠劑 PM/001	手術後、產後之非阻塞性尿 儲留，神經性膀胱緊張力減 低及尿儲留。	應空腹使用。 (1040627 公告) ※廠商缺貨	1.89 元
							
Fluticasone 0.05% 5 g/tube	Cutivate 克廷膚 (葛蘭素) 衛署藥輸字第 023773 號	外用/乳膏	Fluticosone 全佳膚 (十全) 衛署藥製字第 048505 號	外用/乳膏	緩解皮膚病之發炎以及搔癢 症狀。	外用藥膏；不可塗抹 於眼睛；不可口服。 (1040627 公告)	36.9 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Verapamil 240 mg/tab	Isoptin 心舒平 (美商亞培) 衛署藥輸字第 019953 號	淺綠色 長橢圓形 口服/錠劑 △ 剝痕	Cintsu 依心樂 (永信) 衛署藥製字第 037229 號	白色 長橢圓形 口服/錠劑 SR 240	高血壓。	避免飲酒及與葡萄 柚汁併服。可剝半， 不可磨粉。 (1040629 公告) ※Cintsu®恢復供貨	7 元
							
Magnesium Oxide 250 mg/tab	MgO 氧化鎂錠 (景德) 衛署藥製字第 023521 號	白色 圓形 口服/錠劑 SK MGO	MgO 氧化鎂錠 (榮民) 衛署藥製字第 013382 號	白色 圓形 口服/錠劑 445	緩解胃部不適或灼熱感、或 經診斷為胃及十二指腸潰 瘍、胃炎、食道炎所伴隨之 胃酸過多。	腎臟病患須注意劑 量調整。 (1040629 公告) ※廠商缺貨	0.17 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Famotidine 20 mg/amp	Fadin 胃樂順 (生達) 衛署藥製字第 032990 號	針劑/小瓶	Famodine 汎胃定 (南光) 衛署藥製字第 033072 號	針劑/安瓿	住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性（難治的）十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。	藥品劑型由原 vial 改為 amp。 (1040630 公告) ※1040401 健保價調整後換廠	34.3 元
							
Methylprednisolone 500 mg/vail	Mepron 美普隆 (政德) 衛署藥製字第 043726 號	針劑/注射	Methylpredni-solone 甲基普立朗 (永信) 衛署藥製字第 048248 號	針劑/注射	腎上腺皮質機能不全，劇烈休克、支氣管性氣喘、膠原疾病、過敏反應、泛發性感染	※原藥品停止健保給付。 (1040701 公告)	249 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Methylprednisolone 40 mg/vial	Mepron 美普隆 (政德) 衛署藥製字第 043726 號	針劑/注射	Medason 命得生 (南光) 衛署藥製字第 029085 號	針劑/注射	腎上腺機能不全、劇烈休 克、支氣管性氣喘、膠原疾 病、過敏反應、泛發性感染。 (1040701 公告)	※原藥品停止健保 給付。 (1040701 公告)	56 元
							
Cephadrine 1 g/vial	Lofadine 樂華定 (政德) 衛署藥製字第 029504 號	針劑/注射	Licf-A 利復-甲 (信東) 衛署藥製字第 042414 號	針劑/注射	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙 球菌、腦膜炎球菌及其他具 有感受性細菌引起之感染 症。 (1040701 公告)	※原藥品停止健保 給付。 (1040701 公告)	26.1 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Vancomycin 500 mg/vial	Vanco 安克 (政德) 衛署藥製字第 037290 號	針劑/注射	Vancomycin 泛可黴素 (HOSPIRA) 衛署藥輸字第 017742 號	針劑/注射	葡萄球菌感染所導致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所導致之偽膜性結腸炎。	※原藥品停止健保給付。 (1040702 公告)	101 元
							
Calcium Carbonate 500 mg/tab	A- Cal 佳立鈣 (羅得化學) 衛署藥製字第 057816 號	淺黃色 圓形 口服/錠劑 R	Calcium Carbonate 碳酸鈣 (優生) 衛署藥製字第 033686 號	黃色 圓形 口服/錠劑 圖騰	緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。	服藥期間請多喝水。 (1040704公告) ※Calcium Carbonate®恢復供貨	自費價 1 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Mosapride 5 mg/tab	Mopride 摩舒胃清 (東生華) 衛署藥製字第 047656 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 M/P	Mosad 胃莫傷 (五洲) 衛署藥製字第 055564 號	白色 橢圓形 口服/錠劑 UC 28	消化器官蠕動機能異常引起 之不適應狀，包括心窩灼 熱、噁心、嘔吐。	如有心律不整發 生，應減量或停藥。 (1040708 公告) ※1040401 健保價 調整後換廠	2.5 元
							
Human Albumin 20% 50 mL/bot	Plasbumin-20 白蛋白 (Grifols) 衛署菌疫輸字第 000777 號	針劑/注射	Albiomin 人白蛋白 (BIOTEST) 衛署菌疫輸字第 000380 號	針劑/注射	低蛋白血症、休克、傷傷。	開封後應立即使 用，開封後 4 小時未 用完溶液需丟棄。 (1040708 公告) ※廠商缺貨	1212 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Sulpiride 50 mg/cap	Sulmatyl 思邁蒂 (培力) 衛署藥製字第 042946 號	白色 圓形 口服/錠劑 PL	Sulpiride 思碧來 (強生) 衛署藥製字第 021199 號	白色 長橢圓形 口服/膠囊	精神病狀態、消化性潰瘍。	藥品劑型由原 tablet 改為 capsule。 (1040708 公告) ※1040401 健保價 調整後換廠	1.66 元
							
Estradiol & Medroxyproges 1& 2.5 mg/tab; 28 tab/pk	Indivina 順寧娜 (ORION) 衛署藥輸字第 023632 號	白色 圓形 口服/錠劑 1+ 2, 5	Venina 維妮娜 (健喬信元) 衛署藥製字第 048181 號	白色 圓形 口服/錠劑 8Y/1+ 2.5	停經婦女雌激素不足所引起 之諸症狀。	請每日固定時間服 用，服藥期間應避免 懷孕。 (1040710 公告)	182 元/盒
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Glucosamine 250 mg/cap	Chian 節安 (羅得) 衛署藥製字第 041894 號	紅色/白色 長橢圓形 口服/膠囊 ROOT/246	Glustrong 骨永壯 (永信) 衛署藥製字第 043262 號	紅色/白色 長橢圓形 口服/膠囊 YSP GSC	緩解退化性關節炎之疼痛。	※廠商缺貨 (1040710 公告)	1.42 元
							
Dimethyl- Polysiloxane 40 mg/tab	Kascoal 加斯克兒 (永信) 衛署藥製字第 029828 號	白色 圓形 口服/錠劑	Gaslan 加斯朗 (井田) 衛署藥製字第 008355 號	白色 圓形 口服/錠劑 CT/剝痕	解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。	避免飲用碳酸飲料、或易造成氣脹的食物。 (1040710 公告)	0.43 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Ambroxol 75 mg/tab	Ambro SR 談舒 (正和) 衛署藥製字第 050227 號	淡黃色 圓形 口服/錠劑 CH 70	Loxol SR 樂咳痰舒 (健亞) 衛署藥製字第 046386 號	淡黃色 圓形 口服/錠劑	化痰。	可剝半，不可磨粉。 (1040710 公告) ※廠商缺貨	2.61 元
							
Felodipine 5 mg/tab	Stapin 安壓定 (生達) 衛署藥製字第 046480 號	橘色 圓形 口服/錠劑 STD/231	Felpin 菲可平 (信東) 衛署藥製字第 045392 號	淡紅色 圓形 口服/錠劑 STD376/5	高血壓、心絞痛。	請整顆吞服。不可撥 半、磨粉。 (1040716 公告) ※廠商缺貨	3.29 元
							

成分名 Generic Name	換廠前 Before		換廠後 New		用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance			
Vancomycin 500 mg/vial	Vancomycin 泛可黴素 (HOSPIRA) 衛署藥輸字第 017742 號	針劑/注射	U-Vanco 優凡可 (優良) 衛署藥製字第 041443 號	針劑/注射	葡萄球菌感染所導致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血症、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所導致之偽膜性結腸炎。	※廠商缺貨 (1040716 公告)	63 元
							
Sertraline 50 mg/tab	You-Jet 憂解 (南光) 衛署藥製字第 044374 號	白色 長橢圓形 口服/錠劑 NK / 380	Zoloft 樂復得 (輝瑞) 衛署藥輸字第 021780 號	白色 長橢圓形 口服/錠劑 Pfizer/ZLT50	鬱症、強迫症、恐慌症、創傷後壓力症候群 (PTSD) 及社交恐懼症及經前不悅症。	可能造成嗜睡，請小心。 (1040721 公告) ※Zoloft® 恢復供貨	11.7 元
							

104 年 7 月 停用藥品

成分名 Generic Name	藥品名稱 Brand Name	外觀/劑型 Appearance	用途/適應症 Use	注意事項 Caution	健保價
Diphenhydramine & Calamine 10 mg & 80 mg/mL; 60 mL/bt	Dehist Lotion 保膚洗液 (人人化學) 衛署藥製字第 019144 號	外用/液劑	暫時緩解皮膚搔癢，緩解皮膚刺激及尿布疹。	※Sinbaby® 恢復供貨，故停用 Dehist®。 (1040720 公告)	18.2 元
					

所謂「燈塔之下最黑暗」，
 很多人容易對別人
 付出愛心及善解，
 但對自己的家人，
 往往比較困難。

