



HPV疫苗 可預防子宮頸癌！

HPV疫苗知多少





什麼是 HPV ?

人類乳突病毒
(Human Papillomavirus, 簡稱 HPV)
是一種會導致癌化的 DNA 病毒



主要傳染途徑 性行為



高危險型 子宮頸癌超過70%
由高危險型的HPV
第16、18型引起



病變

- 子宮頸癌前病變
- 子宮頸癌
- 男女外生殖器癌

誰容易感染 HPV ?

女性一生中約有**5-7成**機會感染HPV
開始有性行為後，感染機會大增
若伴侶性經驗豐富，且無安全性行為
長期免疫力低落，可能增加感染風險



HPV 疫苗可預防子宮頸癌



HPV疫苗為不活化疫苗，
可誘發人體免疫反應產生抗體，
預防**7成**子宮頸癌發生

⚠ 提醒您！疫苗未涵蓋所有病毒型別

抗原 **10**人中有**7**人受保護



HPV 疫苗知多少？

疫苗保護力 目前台灣與全球一樣核准**3種HPV疫苗**，不論施打那**1種疫苗**，皆可預防最重要的第**16型**及第**18型**引起的子宮頸癌，保護力約**10年**

疫苗價位 每劑疫苗市價約**3000-5000元**

疫苗補助 政府有提供公費施打對象，非補助對象或不想施打公費補助疫苗，可選擇至有提供HPV疫苗接種的醫療院所自費接種



接種注意事項

接種前



- 1 了解HPV疫苗
- 2 決定是否接種(同意者填寫同意書)

接種時



- 1 主動告知病史或特殊狀況
- 2 量體溫
- 3 醫師評估是否接種

接種後




- 1 現場休息**30**分鐘再離開
- 2 現場若有不良反應，通知醫療人員處理
- 3 離開後若有不良反應撥打**24**小時服務專線
0800-88-3513
(寶貝，守護一生)諮詢

哪些人不建議接種 HPV 疫苗？

下列情況不建議接種



接種 HPV 疫苗後
出現過敏症狀者



懷孕者



有計畫懷孕者



特殊疾病史者

接種當天有發燒或感染症狀、正在服藥等情形，應主動告知醫師以進行評估

接種 HPV 疫苗的副作用？

常見副作用：



暈針、發燒、頭痛、噁心



注射部位疼痛
腫脹、紅斑、搔癢



掃我查詢疫苗仿單資訊

★ 接種後應觀察30分鐘再離開

發生副作用或不良反應怎麼辦？



- ➔ 前往醫療機構就醫，並告知醫師疫苗接種史
- ➔ 撥打24小時服務專線
0800-88-3513(寶貝，守護一生)諮詢
- ➔ 撥打各地方政府衛生局**HPV**疫苗諮詢電話
- ➔ 撥打食品藥物管理署不良反應通報中心電話
(02)-2396-0100



自己的健康自己顧！

預防子宮頸癌，三道防線缺一不可！



1 安全性行為



2 接種HPV疫苗



3 定期做子宮頸抹片篩檢

三道防護完整保護 子宮頸癌不上身

更多資訊請上
HPV疫苗專欄

