神經肌肉阻斷劑

Neuromuscular junction blocking
agent

肌肉終板

- 為神經和肌肉的交界處，主要以ACh傳導
- 神經信號->鈣離子湧入，ACh囊泡釋放->和肌肉細胞ACh接收器作用->開啟鈉離子通道->肌肉收縮
- ACh會被ACh esterase 分解->循環合成新的ACh

神經肌肉阻斷劑的作用

- 可依照和受體結合後肌膜是否有去極化分
 - 去極化 (活化劑) : succinylcholine
 - 非去極化(拮抗劑): cistracurium, rocuronium

去極化阻斷：succinylcholine

- 肌膜去極化->使終板持續去極化，最後導致去敏感化
- 肌肉會先震顫，然後再鬆弛
- 在血漿中被butrylcholinesterase 分解
(肝製造)
- 副作用：肌肉痠痛，鉀離子升高，顱內壓升高，眼壓升高，惡性高體溫

非去極化阻斷

- 終板拮抗劑，競爭性，可逆
- 肌肉不會震顫
- 結構分成兩大類
 - 類固醇：rocuronium (組織胺釋放)
 - Benzylisoquinolinium: cisatracurium

藥物比較

	Cisatracurium (Nimbex)	Rocuronium (Zemuron)	Succinylcholine (Relaxin)
分類	非去極化	非去極化	去極化
生效	2~3分鐘	1~2分鐘	1~2分鐘
維持	45~60分鐘	30分鐘	4~6分鐘 (IV) 10~30分鐘 (IM)
恢復	90分鐘	20~30分鐘	9~13分鐘

適應症：插管，外科需要

RSI 快速誘導插管：succinylcholine, Rocuronium

肝腎功能差的：cisatracurium

中風/神經損傷：避免使用succinylcholine

重症肌無力：去極化效果變差，非去極化效果增強

兒童，成人，老年人，肥胖：劑量不一樣

肌肉張力的恢復

- Succinylcholine: 較快速恢復
- 非去極化
 - Neostigmine 抑制Ach esterase 的活性
 - Atropine/glycopyrrolate, Ach 增加口水分泌
- Sugammadex: rocuronium 專一型阻斷劑