

**重點照護-急性心肌梗塞照護**

評估診斷	AMI-01	到急診 10 分鐘內完成 ECG
	AMI-02	病人之初次肌鈣蛋白結果於檢體收件時間 60 分鐘內產出報告之比率
	AMI-03	低密度脂蛋白膽固醇評估
治療處置	AMI-04	STEMI 到急診 6 小時內給予雙重血小板抑制劑治療(阿斯匹靈+ADP 受體拮抗劑)
	AMI-06	STEMI 給予直接經皮冠狀動脈介入術治療時間的中位數
	AMI-07	STEMI 到急診 90 分鐘內施予直接經皮冠狀動脈介入術比率
	AMI-10	住院期間給予乙型阻斷劑
	AMI-11	左心室收縮功能不良(LVSD)患者給予血管張力素轉換酶抑制劑(ACEI)或血管張力素接受器阻斷劑(ARB)
	AMI-12	出院給予雙重血小板抑制劑治療處方(阿斯匹靈+ADP 受體拮抗劑)
預後照護	AMI-14	病人主診斷為急性心肌梗塞之住院期間非計畫性重返加護病房
	AMI-15	住院中死亡率(含病危自動出院)

**重點照護-急性中風照護**

評估診斷	STK-01	急性中風發作 3 小時 (含)內抵達急診，且在 25 分鐘內(含)接受電腦斷層(CT)檢查
治療處置	STK-02	急性缺血性中風發作 2 小時(含)內抵達急診，且在發作 3 小時(含)內施打靜脈血栓溶解劑 (IV-tPA)
	STK-03	急性缺血性中風接受靜脈血栓溶解劑(IV-tPA)治療
	STK-04	急性缺血性中風抵達急診 60 分鐘(含)內接受靜脈血栓溶解劑(IV-tPA)治療
	STK-05	急性缺血性中風接受靜脈血栓溶解劑(IV-tPA)治療，發生症狀性腦出血比例
	STK-06	非外傷性(Non-Traumatic)出血性中風病人開立照會後 30 分鐘(含)內經神經外科評估接受「評估手術必要性」