



肺舒坦

Foster®(Beclomethasone & Formoterol)

定量吸入劑


100/6 mcg/dose, 120 doses/bot



肺舒坦定量吸入劑適用於需規律使用吸入型皮質類固醇與支氣管擴張劑合併治療的氣喘病患。此藥物不適用於治療氣喘之急性發作。請依醫師指示劑量使用，勿自行調整劑量。

如何使用此藥物？

1. 移去護蓋。(可接上塑膠輔助器)




第一次使用吸入劑前，或吸入劑未使用達到或超過 14 天，為確保吸入劑正常使用，應先向空氣試壓一次。

2. 將吸入劑直立置於拇指和食指間，拇指放於底部，亦即吸口下方。然後避開吸口，儘量的吐氣。



3. 將吸入口置於齒間，緊閉嘴唇，含住吸口。



4. 吸氣並同時將吸入劑的上方往下壓以釋出藥物，緩慢且深深地吸入藥物。
5. 將吸入劑從嘴唇移開，**閉氣10秒**。
6. 若醫師指示需再吸第二個劑量，請至少間隔 30 秒，再重覆步驟 2-5。
7. 蓋回瓶蓋。
8. 使用後請以清水漱口且將水吐出。

注意事項：

1. 定期(每週)清潔：用乾布將吸入口擦拭乾淨。**絕對不可用水清洗。**
2. 餘量顯示：搖一搖藥瓶，如果還有液體晃動的感覺，表示藥瓶內仍有藥物。
3. 儲存需知：
未開封使用的肺舒坦吸入劑，請儲存於冰箱 (2-8°C)。
開封後存放於室溫(< 25°C) 可保存 5 個月。



病患用藥指導

佛教花蓮慈濟綜合醫院藥劑部

假如我忘記用藥應該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快使用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次用藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起使用。請直接省略一次劑量，根據原來應該用藥時間使用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律使用藥物。

若您在使用此藥期間出現任何不適症狀，請向您的醫師或藥師詢問～