



美爾胰錠

Glimepiride 2mg & Metformin 500mg/tab
(Amaryl® M)



美爾胰錠治療以 glimepiride 或 metformin 單一藥物療法仍無法達到適當的血糖控制之第二型糖尿病患者，作為飲食和運動之外的輔助。不適合作第一線治療。

如何使用您的藥物？

美爾胰錠的治療必須在醫師的監控下開始。使用劑量是根據定期檢查血糖的結果來設的。正常情況下，**美爾胰錠**建議應該於餐前或隨餐服用。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

為什麼我要抽血做檢查呢？

服用**美爾胰錠**需要作血液檢查血糖、糖化血色素、血脂肪及肝腎功能等相關生化檢查值，藉此以確認藥物的治療效果及是否引起任何可能之副作用。

美爾胰錠可能引起之副作用？

美爾胰錠與其他用於治療糖尿病的藥物一可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

1. 如果發生低血糖症狀如頭痛、飢餓、發抖、冒冷汗、心跳加快、無力、頭暈、嘴唇麻、視覺障礙等，應立即進食含 10-15 公克易吸收之糖份的食品，例如：含糖飲料（120-150 毫升）、3-4 顆方糖或一湯匙蜂蜜。如果沒有改善或有

意識不清、抽筋或昏迷的現象，應立刻送醫院。

2. 開始治療可能因血糖值發生改變而導致暫時性的視覺障礙。通常會隨著服藥時間而改善。
3. 偶爾可能發生噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、腹瀉或過敏現象如皮膚搔癢、紅疹。
4. 一些嚴重但極少見的副作用如：嚴重低血糖，血球型態的變化，嚴重過敏或肝衰竭。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 正在使用其他藥物或使用酒精性飲料
2. 有任何的藥物過敏經驗
3. 已經懷孕或者計畫懷孕
4. 正在餵母乳
5. 有其他疾病

使用降血糖藥物的一般原則：

1. 適當的飲食及運動是極重要的，即使服用藥物亦不可取代飲食及運動控制的重要性。
2. 不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。