



安索糖錠 Pioglitazone (Anxotos®) 30 mg/tab



安索糖 是一種 thiazolidinedione 類口服抗糖尿病藥品，必須有胰島素存在下才有作用。主要的作用是增進胰島素敏感度及且降低肝臟葡萄糖的產量，藉以使血糖控制獲得改善。可單獨治療或與 sulfonylurea，metformin 類口服降血糖藥物合併使用，適用於治療非胰島素依賴型(第 2 型)糖尿病。本院有 30 毫克白色錠劑。

如何使用您的藥物？

愛妥糖 的治療必須在醫師的監控下開始。使用劑量是根據定期檢查血糖的結果來設定的。**愛妥糖** 的投藥時間與劑量分配方式，應該由醫師考量您的生活型態來決定。正常情況下，可與食物併服或空腹使用。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

為什麼我要抽血做檢查呢？

服用 **愛妥糖** 需要作血液檢查血糖、糖化血色素、血脂肪及肝腎功能等相關生化檢查值，藉此以確認藥物的治療效果及是否引起任何可能之副作用。

愛妥糖 可能引起之副作用？

愛妥糖 與其他用於治療糖尿病的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師。

1. 以 **愛妥糖** 治療的患者中，有少數可能引起貧血、水腫。
2. 可能會產生導致充血性心臟衰竭更加惡化的體液滯留，對有發生心臟衰竭危險的患者，應密切監視。
3. 可能造成與劑量有關的體重增加，造成體重增加的作用機轉尚未清楚，可能是因體液滯留及脂肪堆積。
4. 少數可能發生肝功能不良反應，主要是肝臟酵素含量增高。
5. 可能會使更年期就已經停止排卵且具胰島素抗性的婦女恢復排卵。因此，須考慮採取避孕措施。

1.

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 正在使用其他藥物或使用酒精性飲料
2. 有任何的藥物過敏經驗
3. 已經懷孕或者計畫懷孕
4. 正在餵母乳
5. 有其他疾病

使用降血糖藥物的一般原則：

1. 適當的飲食及運動是極重要的，即使服用藥物亦不可取代飲食及運動控制的重要性。
2. 不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。