



佳糖維

Sitagliptin (Januvia®) 100mg/tab



佳糖維用於治療第二型糖尿病患者，經抑制腸泌素(incretin)之水解作用，可增強腸泌素作用進而增加胰島素分泌，達到降血糖的效果。作為飲食和運動之外的輔助，不適合作第一線治療。

如何使用您的藥物？

佳糖維的治療必須在醫師的監控下開始使用，劑量是根據定期檢查血糖的結果來設的。

正常情況下，通常一天服用一次，可和食物併用，亦可不和食物併用。請遵照醫師的指示使用藥物，如果對此藥有任何疑問，請諮詢您的醫師或藥師。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

為什麼我要抽血做檢查呢？

服用**佳糖維**需要作血液檢查血糖、糖化血色素、血脂肪及肝腎功能等相關生化檢查值，藉以確認藥物的治療效果及是否引起任何可能之副作用。

佳糖維可能引起之副作用？

佳糖維與其他用於治療糖尿病的藥物一樣，可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。若您有下列症狀發生嚴重的情形或無法消除時，請告知醫師或藥師：腹瀉、便秘、噁心、週邊水腫、咽喉發炎。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 正在使用其他藥物或使用酒精性飲料
2. 有任何的藥物過敏經驗
3. 已經懷孕或者計畫懷孕
4. 正在餵母乳
5. 有其他疾病

使用降血糖藥物的一般原則：

1. 適當的飲食及運動是極重要的，即使服用藥物亦不可取代飲食及運動控制的重要性。
2. 不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。