



## 力必平

## Ropinirole

### 持續性藥效 (Requip® Prolonged Release Tablet)

### 膜衣錠

2 mg/tab



力必平是多巴胺 (dopamine) 接受體的強力催動劑，可以單獨使用治療原發性巴金森病，或是加入左旋多巴胺 (levodopa) 的療程中，可用以控制病情的波動現象，並可減少左旋多巴胺的每日總劑量。

在您服用力必平之前，您應該讓醫師或藥師知道您是否有下列情況：

1. 您正在使用其他藥物，其中包括非處方藥、營養補給藥品、草藥等。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者正計劃懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有飲酒的習慣或是長期使用安眠藥或精神安定劑。
6. 您有其他疾病，如嚴重心血管疾病。

#### 應該如何使用力必平？

力必平可於飯前半小時或飯後一小時與一杯白開水一起吞服，若此藥物讓您感到胃不舒服，則可與食物一起併用。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

#### 如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

#### 服用力必平時可能會發生哪些副作用？

力必平與其他用於治療巴金森氏症的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此，您使用此藥若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師。

- ☆較常見：噁心、嗜睡、腿部水腫、腹痛、嘔吐、暈厥、姿勢性低血壓
- ☆較少見：運動困難、幻覺、消化不良、意識混淆

#### 當您在服用力必平期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師評估您整個病情的制情況，並調整至最佳的藥物治療方式。
2. 需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，尤其是老年人，如此便可以避免頭暈等現象。
3. 使用力必平時，駕駛車輛或操作機械時應特別小心，必要時請避免開車及參加其他可能發生危險的活動。

#### 藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。