



## 卡馬平

Carmapine® CR (Carbamazepine) 200mg/tab

### 長效膜衣錠



**卡馬平長效膜衣錠**為一種抗癲癇藥物，可單獨使用或併用來治療某些類型癲癇發作。另外也可用來減緩三叉神經痛，有時此藥還可用於治療其他病症，請諮詢您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

#### **卡馬平長效膜衣錠 可能引起之副作用？**

**卡馬平長效膜衣錠** 與其他的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

**早期之副作用：**剛開始治療較常見之副作用包括：複視、頭痛、噁心、嗜睡、暈眩。這些副作用通常在身體對藥物適應或調整劑量後就會消失。

**後期之副作用：**若是長期使用才出現複視、頭痛、噁心、嗜睡、暈眩等副作用，表示您使用藥物的劑量需要調整。另外使用此藥偶爾會胃痙攣的情形。

**較少見副作用：**可能引起血球方面的異常而造成發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍或者不尋常之出血、瘀斑等。如果這些症狀持續，請立刻告知您的醫生。

**皮膚疹：**可能造成過敏性皮膚疹。有些病人在使用此藥時引起皮膚疹，如果這些症狀持續，請立刻告知您的醫生。

#### **如果您忘記服藥該怎麼辦？**

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

**當您在服用卡馬平長效膜衣錠期間，應該注意些什麼？**

- 1.請定期回診，讓您的醫師幫您做一些檢查，藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。
- 2.您在服藥期間可能會有嗜睡現象，請不要開車或操作機械。
- 3.請按時服用，千萬不要在沒有醫師的允許下自行停藥。

**卡馬平長效膜衣錠 是否可以與食物或其他藥物一起服用？**

一般狀況下可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用之其他藥物讓醫師知道才可作最好的評估。必須注意的是有些藥，如：抗生素（紅黴素；Erythromycin）及胃藥（祛潰；Cimetidine）可能會使此藥產生更多的副作用，因此應該避免同時使用。並請勿同時飲用酒精性飲料。

**如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：**

- 1.您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
- 2.您有任何的藥物過敏經驗
- 3.您已經懷孕或者計畫懷孕
- 4.您正在餵母乳
- 5.您有其他疾病

**使用抗癲癇藥物的一般原則：**

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。
2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

**藥品保存方式：**

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕



## 病患用藥指導

佛教花蓮慈濟綜合醫院藥劑部

氣。

2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。