



## 癲能停 Dilantin® (Phenytoin) 100 mg/cap



**癲能停**是一種抗癲癇藥物，此種藥物對大多數的癲癇發作有效，包括全盤性強直陣攣發作（大發作）及部份發作皆有良好的治療效果。部份病人可單獨使用**癲能停**控制癲癇的發作，但有些病人必須合併使用其他藥物。本院有**癲能停** 100 毫克膠囊。

### 癲能停 可能引起之副作用？

**癲能停**與其他用於治療癲癇的藥物一樣，可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥，若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師或藥師。

**過量或敏感的徵象：**包括眼球不自主的前後移動或轉動，視力模糊或複視，精神紊亂或幻覺，嚴重暈眩或嗜睡，口齒不清或步伐不穩。

**較少見的副作用：**皮膚疹，異常出血或瘀血，無法解釋的喉嚨痛或發燒，尿液顏色變暗或淋巴腺腫大，嚴重的胃痛或眼睛發黃等等症狀

**比較不具重要性的副作用**（但是如果您仍然覺得困擾請告訴您的醫師）：包括頭痛，便秘，輕微的嗜睡或暈眩，齒齦腫大或觸痛及不尋常的毛髮增生。

### 應該如何使用癲能停？

**癲能停**是口服錠劑，請與一杯白開水一起吞服。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

### 如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規

律服用藥物。

### 當您在服用癲能停 期間，應該注意些什麼？

請定期回診，讓您的醫師可能幫您做一些檢查，藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。

### 癲能停 是否可以與食物或其他藥物一起服用？

在服用**癲能停**之前請您將服用之其他藥物讓醫師知道。因為**癲能停**可能與某些食物及藥物產生交互作用，例如抗凝血藥物可邁丁。

### 如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

### 使用抗癲癇藥物的一般原則：

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。
2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

### 藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。