



鎮頑癲

膜衣錠

Neurontin® (Gabapentin) 600mg/tab



鎮頑癲為一種抗癲癇藥物，用於癲癇的輔助治療，與其他抗癲癇藥物併用來治療局部發作型痙攣。有時此藥還可用於治療其他病症，相關問題請諮詢您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

鎮頑癲 可能引起之副作用？

鎮頑癲與其他的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

較常見的副作用：噁心、嘔吐、嗜睡、暈眩、步態不穩、運動失調、倦怠、焦慮。

較嚴重的副作用：嚴重或持續的痙攣。

應該如何使用鎮頑癲？

鎮頑癲是口服錠劑，請與一杯白開水一起吞服。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

當您在服用鎮頑癲 期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師幫您做一些檢查，藉此確認藥物是否引起任何可能之反應。

2. 您在服藥期間可能會有嗜睡現象，請不要開車或操作機械。
3. **鎮頑癲**可能需要好幾個禮拜才會達到理想治療效果，請耐心服用，千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

鎮頑癲 是否可以與食物或其他藥物一起服用？

一般狀況下**鎮頑癲**可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用之其他藥物讓醫師知道才可作最好的評估。**鎮頑癲**與制酸劑的服用時間需間隔兩小時以上，並請勿同時服用**鎮頑癲**及飲用酒精性飲料。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

使用抗癲癇藥物的一般原則：

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。
2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。