



救癲易 Sabril® (Vigabatrin) 500mg/tab



救癲易是一種抗癲癇藥物，對部份發作及全盤性強直陣攣發作（大發作）有良好的治療效果。通常作為其他抗癲癇藥物無法完全控制的輔助用藥。本院有 500 毫克膜衣錠。

救癲易可能引起之副作用？

救癲易與其他用於治療癲癇的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

副作用：不良反應常和中樞神經方面有關，例如：頭痛、疲倦、暈眩、神經緊張、容易激動、精神不集中、記憶失常、幻覺產生、複視等。

其他不良反應例如體重增加，輕微的胃腸道不適。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

當您在服用**服利寧**期間，應該注意些什麼？

請按時服用藥物，千萬不要在沒有醫師的允許下自行停藥。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳

5. 您有其他疾病

使用抗癲癇藥物的一般原則：

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。
2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。