



妥泰 100 毫克

妥泰 25 毫克

妥泰 Topamax® (Topiramate)



妥泰是一種抗癲癇藥物，此種藥物用於癲癇的輔助治療，與其他抗癲癇藥物合併使用，對於成人的部分複雜型發作、兒童的癲癇有顯著的效果。本院有妥泰 25 和 100 毫克錠劑。

妥泰可能引起之副作用？

妥泰與其他用於治療癲癇的藥物一樣，可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥，若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師或藥師。

過量或敏感的徵象：包括眼球不自主的前後移動或轉動，運動失調，嗜睡或暈眩，精神混亂，口齒不清，緊張，記憶力減退，震顫，上呼吸道感染，胸痛，水腫。

較少見的副作用：憂鬱，注意力不集中，感覺遲鈍，食慾減退，腹部疼痛，肌肉疼痛或僵硬，腎結石，聽力減退。

比較不具重要性的副作用（但是如果您仍然覺得困擾請告訴您的醫師）：包括口乾，便秘，疲倦，齒齦炎，體重減輕。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

當您在服用樂命達錠期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師幫您做一些檢查，藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。

2. 您在服藥期間可能會有嗜睡現象，請不要開車或操作機械。
3. 請按時服用，千萬不要在沒有醫師的允許下自行停藥。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

使用抗癲癇藥物的一般原則：

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。
2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。