



## 安賜他明錠

## Acetazolamide (Acetazolamax®) 250mg/tab



**安賜他明**是一種抗癲癇藥物，通常作為第二線（輔助）用藥來控制單純或複雜性的部份癲癇發作。

**安賜他明**能降低眼壓，可以用來治療青光眼。也可以用來減輕高山病的一些症狀，如：胃不舒服、頭痛、呼吸短促、眩暈、嗜睡等。

本院有**安賜他明** 250 毫克白色錠劑。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

- 1.您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
- 2.您有任何的藥物過敏經驗
- 3.您已經懷孕或者計畫懷孕
- 4.您正在餵母乳
- 5.您有其他疾病

應該如何使用**安賜他明**？

**安賜他明**是口服錠劑，請與一杯白開水一起吞服。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

服用**安賜他明**可能引起之副作用？

**安賜他明**與其他的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥，若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師或藥師。

1. **安賜他明** 具有輕微的利尿作用，因此會增加排尿。但是這種作用通常於藥物治療 2-4 天會自然消失。
2. 特別感覺疲倦或衰弱。
3. 噁心或腹瀉。
4. 食慾降低或口中有金屬味。
5. 四肢感覺麻木或刺痛感。
6. 鉀離子降低而造成肌肉痙攣，異常的疲倦或衰弱。您若覺得有這些現象發生，可以多喝柳橙汁或每天吃一根香蕉來增加鉀離子的攝取。
7. 服用**安賜他明**的同時，很重要的是請您喝大量的水以避免腎結石的可能。
8. 正如其他藥物一般，**安賜他明**偶而也會造成過敏反應。若是您有出現皮膚疹，不正常出血，或其他問題，也請您告知醫師。

當您在服用**安賜他明**期間，應該注意些什麼？

請定期回診，讓您的醫師可能幫您做一些檢查，藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。