


Choosing Wisely


減少慢性腎臟病患者的 NSAIDs Exposure

慢性腎臟病防治中心
林于立 醫師

2020 ESRD Incidence



111年度健保支出前五大疾病(億)



科技守護病人安全 強化腎病用藥三層防護


1 摘要區提示：中、重度腎病患者宜注意用藥訊息

CKD第3B期至第5期病人


2 NSAIDs用藥提示：28天內NSAIDs口服藥、貼布及軟膏使用情形

3 高風險腎臟病病人NSAIDs用藥提示



CKD第3A期至第5期及慢性透析病人、腎功能狀態不明
跨院重複開立醫囑主動提示功能Web service



2588位eGFR<60病患中，615人(24%)曾曝露NSAIDs



NSAID use ≥ 7 days



住院醫囑

☆ AdmSetPrinter ☆

NSIAD藥物

病歷號碼

性別

男

入院日

1120719

出生日

主治醫師

林于立

科別

腎臟內科

此病患為腎臟病病患(報告時間:1120731 eGFR:12.54), 宜避免長期NSAIDs使用, 請選用其他止痛藥品。若仍有需求, 請短期使用(3天內)。

替代藥品如下

	選擇	藥名	用量	頻率	天數
1	☐	Acetal 500mg/tab (Acetaminophen)	1	QID	7
2	☐	★Muaction 100mg/SR tab (Tramadol HCl)	1	QD	7
3	☐	★Tramacet (Tramadol 37.5 mg& Acetaminophen)	1	Q6H	7

維持原處方原因

- ☐ 已充份告知腎功能惡化風險, 病患仍要使用該藥, 將定期監測腎功能。
- ☐ 因病情需要, 無替代藥物可使用, 將定期監測腎功能。
- ☐ 病患為透析病患, 且已無殘餘腎功能(無尿)。
- ☐ 其他(請註明原因)

確認新增

離開

門診醫囑

frmPnls

此病患為腎臟病病患(1120731 eGFR:5.11)，宜避免長期NSAIDs使用，請選用其他止痛藥品。若仍有需求，請短期使用(3天內)。

維持原處方

返回原畫面
修改處方

確認

腎功能狀態不明		3A	3B	4	5	慢性透析病人
6個月內無eGFR	12個月內無eGFR					
27天(含)	13天(含)	15天(含)	8天(含)	4天(含)		