

兒_ル科_カ

入_リ院_{イン}預_ヨ防_{ボウ}跌_{セツ}倒_{タウ}
措_{サツ}施_シ護_ゴ理_リ指_シ導_{ドウ}

我的孩子會跌倒嗎？



病人安全 起來

請輸入病人身分證

掃描

邀請您共同瞭解住院期間可能造成跌倒的
危險因子，與我們一同維護病患安全。

開始填表

兒童跌倒危險因子評估

選一看 選一看

第二步：您認為 符合以下那些情況，請點選合適的答案。

年齡



☐ ≤3歲

☒ >3歲

性別



☐ 男生

☒ 女生

活動



☐ 需要協助

☐ 不需要協助

疾病史



☐ 有神經或腸胃系統方面診斷

☐ 無神經或腸胃系統方面診斷

跌倒



☐ 有跌倒經驗

☐ 無跌倒經驗

輔具



☐ 有使用輔具

請選擇至少一項工具

☐ 使用嬰兒推車

☐ 未使用輔具

☐ 使用輪椅

☐ 使用活動點滴架

☐ 無

☐ 降血壓藥物


☐ 麻醉性止痛藥

☐ 抗血糖藥物

☐ 肌肉鬆弛劑

床欄紅綠燈

安全




危險





常見跌倒的原因

1. 只是轉身拿東西；所以不需要拉床欄！
2. 床欄半拉；我就在旁邊不會跌倒啦~~



我應該怎麼做？

1. 若需要短暫離開病童身旁，應拉高床欄告知病童及護理人員
2. 將叫人鈴置於病童可及處



注意！

親子床長度180公分；照顧者可與孩子一起睡
要注意！！ 床欄還是要拉高！！



注意！

孩子身高 90公分以上或5歲以上

禁止站立在床上或跑、跳

床頭或床尾避免堆放枕頭或棉被讓孩子攀爬




陪病椅使用

6歳以下禁止單獨乘坐

左无
支撐點



右邊靠牆
有支撐點



住院期間 可能使用的工具

嬰兒推車

兒童輪椅

活動點滴架

2歲以下及體重10公斤以下
建議使用嬰兒推車

使用輪椅前 請先檢查



正確使用輪椅 預防跌倒 好安全

兒童輪椅

使用
安全帶



輪椅
手煞車




嬰兒推車

1. 記得繫上**安全帶**
2. **禁止**<雙載>



輔具使用公約

1. 禁止飆車，禁止雙載。
2. 點滴機器禁止放在推車及輪椅上。
3. 車子靜止不動時，請記得煞車。



活動點滴架

勿站在點滴架上，勿於點滴架上玩耍



適_ふ合_ふ的_な鞋_せ子_こ

過大



適當大小
防滑



適_ち合_あ的_て衣-褲_ち

勿_な穿_く著_し過_こ長_い的_な衣-褲_ち容_い易_い、踩_ふ到_く、
褲_ち管_く滑_る倒_く



貼心叮嚀

預防跌倒-提醒臂章



貼心叮嚀

床頭預防跌倒提醒



寶_{ㄅㄠˇ}貝_{ㄅㄟˋ}的_{ㄉㄜˊ}安_ㄢ全_{ㄑㄩㄢˊ}

需_{ㄒㄩ}要_{ㄧㄠˋ}您_{ㄣㄟˊ}我_{ㄨㄛˊ}一_ㄟ起_{ㄑǐ}守_{ㄕㄨㄚˇ}護_{ㄏㄨˋ}

二_{ㄦˊ}七_{ㄑㄩ}西_{ㄒㄩ}病_{ㄅㄧㄥˊ}房_{ㄈㄤˊ}

關_{ㄍㄨㄢ}心_{ㄒㄩㄢ}您_{ㄣㄟˊ}的_{ㄉㄜˊ}寶_{ㄅㄠˇ}貝_{ㄅㄟˋ}